

Gebrauchsinformation, bitte aufmerksam lesen!

Uvalysat® S Bürger

Lösung

Wirkstoff: Bärentraubenblätter-Fluidextrakt



Zusammensetzung	100 g (95 ml) Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 98,8 g Fluidextrakt aus Bärentraubenblättern (1-2,6:1), entsprechend 5,6 g Hydrochinon-derivaten, berechnet als wasserfreies Arbutin. Auszugsmittel: 22% (V/V) Ethanol. Sonstige Bestandteile: Sorbinsäure, Macrogol-Glycerolhydroxystearat, gereinigtes Wasser.
Darreichungsform und Inhalt	Lösung zum Einnehmen: Tropfflaschen 30 ml (N1) 50 ml (N2) 100 ml (N3).
Wirkungsweise	Pflanzliches Arzneimittel bei Harnwegserkrankungen.
Hersteller und Vertrieb	Johannes Bürger Ysatabrik GmbH 38667 Bad Harzburg Tel.: (0 53 22) 44 44, Fax: 78 02 29
Anwendungsgebiete	Entzündliche Erkrankungen der ableitenden Harnwege. Hinweis: Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 7 Tage ist ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen	Uvalysat® S Bürger Lösung ist bei Alkoholkranken nicht anzuwenden. Uvalysat® S Bürger Lösung ist bei Leberkranken erst nach Rücksprache mit dem Arzt anzuwenden. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte Uvalysat® S Bürger Lösung, auch wegen des Alkoholgehaltes, nicht angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb, auch wegen des Alkoholgehaltes, bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Wechselwirkungen	Siehe Warnhinweise!
Warnhinweise	Dieses Arzneimittel enthält 22 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme von 90 Tropfen Uvalysat® S Bürger Lösung bis zu 0,83 g Alkohol zugeführt. Vorsicht ist geboten. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung	1 ml Lösung entspr. ca. 25 Tropfen entspr. ca. 60 mg Hydrochinonderivaten, berechnet als Arbutin. Soweit nicht anders verordnet: Die Einzeldosis beträgt 1,7 bis 3,5 ml Lösung bzw. 40 bis 90 Tropfen (100 bis 210 mg Hydrochinonderivate) und soll bis zu höchstens 4 mal täglich eingenommen werden (Tagesdosis 400 bis 840 mg Hydrochinonderivate). Die Dosen sollen in möglichst gleichmäßigen Abständen über den Tag verteilt eingenommen werden, nach Belieben zusammen mit etwas Flüssigkeit. Das Arzneimittel soll ohne ärztlichen Rat nicht länger als jeweils 1 Woche und höchstens 5 mal jährlich angewendet werden.
Hinweise für den Fall der Überdosierung	Von Uvalysat® S soll pro Tag nicht mehr eingenommen werden, als in der Dosierungsanleitung angegeben oder vom Arzt verordnet ist. Wenn versehentlich eine Einzeldosis mehr als vorgesehen eingenommen wird, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Die Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen kann jedoch erhebliche Beschwerden (z.B. Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit und Erbrechen, aber auch Blut im Urin und Leberschäden) hervorrufen. In diesem Fall, auch wenn noch keine Beschwerden aufgetreten sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Nebenwirkungen

Bei magenempfindlichen Patienten können nach Einnahme von Uvalysat® S Übelkeit und Erbrechen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und
Angaben zur
Haltbarkeit des
Arzneimittels**

Das Verfalldatum dieser Packung ist aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch des Behältnisses soll das Arzneimittel nach einer Frist von 6 Wochen nicht mehr verwendet werden.

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information

Oktober 2001.

Eigenschaften

Uvalysat® S ist ein auf Hydrochinonderivate (Arbutin) eingestellter Bärentraubenblätterfluidextrakt.

Die Wirkung beruht auf der Freisetzung von antibakteriell wirksamem Hydrochinon in den ableitenden Harnwegen aus den im Organismus entstandenen Umwandlungsprodukten (Metaboliten) der physiologisch indifferenten Hydrochinonderivate (Transportform). Da eine Resistenzentwicklung der Erreger gegen Hydrochinon nicht eintritt, ist Uvalysat® S besonders bei (noch) nicht antibiotikabedürftigen akuten Entzündungen der ableitenden Harnwege zu empfehlen. Auch die Nachbehandlung einer Antibiotikatherapie mit Uvalysat® S kann sinnvoll sein.

Ein bewährtes Produkt aus der Ysat®-Reihe

Ysaatfabrik
