

Gebrauchsinformation



Spray

Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat)

Zusammensetzung:

50ml Lösung enthalten:

arzneilich wirksamer Bestandteil: 500 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat)

Sonstige Bestandteile: Propan-2-ol (4%)

Gereinigtes Wasser

Sprühflasche (ohne Treibgas) mit 50 ml Lösung

Lokales Antiseptikum

Beiersdorf AG, D-20245 Hamburg, Tel.: 040/4909-0, Fax: 040/4909-3434

Hersteller: Bode Chemie GmbH & Co., Melanchthonstr. 27, D-22525 Hamburg

Anwendungsgebiete:

Zur lokalen antiseptischen Behandlung von oberflächlichen Hautverletzungen wie Schnitt-, Schürf- und Risswunden.

Gegenanzeigen:

Hansaplast med Spray darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidinbis(D-gluconat) oder Propan-2-ol (4%), auf Schleimhäuten, im Bereich der Augen und Ohren, bei tiefen Wunden, großflächigen tiefen Verletzungen, Geschwüren (Ulzerationen), schlecht durchblutetem Gewebe und bei Säuglingen.

Hansaplast med Spray soll während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht großflächig angewendet werden.

Wechselwirkungen:

Chlorhexidinbis(D-gluconat) sollte nicht mit Seifen und anderen anionischen Substanzen sowie Kaliumjodid angewendet werden. Chlorhexidinbis(D-gluconat) kann durch Saccharose, Polysorbat-80 und unlösliche Magnesium-, Calcium- und Zinksalze inaktiviert werden.

Anwendung und Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet Hansaplast med Spray aus ca. 10 cm Entfernung gleichmäßig auf die Wunde sprühen und einige Minuten warten, bis der Feuchtigkeitsfilm getrocknet ist.

Bei Bedarf die Wunde mit einem Wundpflaster abdecken.

Nebenwirkungen:

Wie alle Arzneimittel kann Hansaplast med Spray Nebenwirkungen haben. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

Sehr häufig: $\geq 10\%$ mehr als 1 von 10 Behandelten	häufig: $\geq 1\% - < 10\%$ mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: $\geq 0,1\% - < 1\%$ mehr als 1 von 1000 Behandelten	Selten: $\geq 0,01\% - < 0,1\%$ mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: $< 0,01\%$ 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

In sehr seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen bis hin zu Atemnot und Schock kommen.

Bei sehr häufiger Anwendung sind gelegentlich Hautreaktionen aufgrund des Kontaktes mit Chlorhexidinbis(D-gluconat) (Kontaktdermatitiden) und erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Lichteinwirkung (Photosensibilisierung) beobachtet worden.

Beim Auftragen der Lösung auf Schürfwunden kann ein vorübergehendes Brennen verspürt werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Inhalt vor Licht und Wärme schützen! Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Hansaplast med Spray nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Stand der Information: Januar 2004

Reg. Nr. 43328

Tipps für kleine Wunden

- Grundsätzlich: Nur solche Wunden selbst versorgen, die glatte Wundränder haben und nicht infiziert sind.
- Schwach oder nicht blutende Wunden zuerst mit Hansaplast med Spray aus der Apotheke desinfizieren.
- Die Wunde anschließend mit Pflaster abdecken. Sie bleibt so sicher vor äußeren Einflüssen geschützt.
- Beim Anbringen des Pflasters Wunde und Wundauflage möglichst nicht berühren.
- Damit das Pflaster gut klebt, sollte die umliegende Haut trocken und sauber sein.
- Pflaster faltenfrei und ohne Spannung aufkleben und gut andrücken.
- Auf behaarter Haut das Pflaster in Wuchsrichtung der Haare aufkleben. In dieser Richtung auch wieder abziehen – so tut's nicht weh.
- Pflaster mindestens einmal täglich wechseln.
- Großflächige oder tiefe Wunden sowie Bissverletzungen und stark verschmutzte Wunden müssen vom Arzt versorgt werden.

Außerdem: Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Tetanus-Impfschutz und den Inhalt Ihrer Hausapotheke, damit Sie auf Notfälle gut vorbereitet sind.

BDF ●●●●

Beiersdorf AG

D-20245 Hamburg, Germany

® = reg. tm. Beiersdorf AG

Ⓛ Beiersdorf AG, D-20245 Hamburg