

## Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



## Gebrauchsinformation



### Zusammensetzung:

**Arzneilich wirksamer Bestandteil:** 1 g Creme enthält 0,01 g Clotrimazol.

**Sonstige Bestandteile:** Cetomacrogol 1000, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Glycerol 85%, Glycerolmono/di(palmitat, stearat),  $\alpha$ -Hexadecyl, octadecyl- $\omega$ -hydroxypoly(oxyethylen)-12, Octyldodecanol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser, Phenoxyethanol (Ph. Eur.).

### Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 20 g (N1) und 50 g (N2) Creme

**Stoff- oder Indikationsgruppe:** Anti-Pilzmittel (Antimykotikum)

### Pharmazeutischer Unternehmer:

STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259, Internet: <http://www.stada.de>

**Hersteller:** STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

### Anwendungsgebiete:

Bei Pilzinfektionen (Mykosen) der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z. B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere wie Malassezia furfur, z. B. in Form von:

- Mykosen der Füße (Fußpilz), der Haut und Hautfalten
- oberflächlichen Candidosen
- Kleinpilzflechte (Pityriasis versicolor)
- Zwergflechte (Erythrasma; Erreger: Corynebacterium minutissimum).

### Gegenanzeigen:

#### **Wann dürfen Sie cutistad® Creme nicht anwenden?**

Bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Clotrimazol oder einem der sonstigen Bestandteile dürfen Sie cutistad® Creme nicht anwenden.

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol und gegen das Konservierungsmittel Phenoxyethanol ist eine von diesen Stoffen freie Darreichungsform anzuwenden (z. B. cutistad® Lösung oder cutistad® Spray).

#### **Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Clotrimazol-haltige Präparate sollten in der Frühschwangerschaft nicht angewendet werden, da eine epidemiologische Studie Hinweise auf eine erhöhte Frühgeburtsrate nach vaginaler Anwendung von Clotrimazol in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft ergeben hat.

Um einen direkten Kontakt mit dem Säugling zu vermeiden, darf cutistad® Creme in der Stillzeit im Brustbereich nicht angewendet werden.

#### **Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?**

Besondere Anpassungen sind nicht notwendig.



### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Keine.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

**Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von cutistad® Creme oder werden selbst in ihrer Wirkung beeinflusst?**

Durch den Wirkstoff Clotrimazol vermindert cutistad® Creme die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyen-antibiotika wie Nystatin und Natamycin.





### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt cutistad® Creme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da cutistad® Creme sonst nicht richtig wirken kann.

#### **In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie cutistad® Creme anwenden?**

Für eine etwa handtellergroße Hautfläche reicht ca. 1/2 cm langer Cremestrang aus. cutistad® Creme wird 2-mal täglich angewendet.

Bei Fußpilz: Die Anwendung 1-mal täglich ist ausreichend.

#### **Wie sollten Sie cutistad® Creme anwenden?**

Die Creme auf die erkrankten Hautpartien dünn auftragen und einreiben.

#### **Wie lange sollten Sie cutistad® Creme anwenden?**

Für den Behandlungserfolg ist eine regelmäßige und ausreichend lange Anwendung wichtig.

Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich und hängt vom Ausmaß und dem Ort der Pilzinfektion ab. Um eine komplette Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung nach dem Abklingen der akuten Beschwerden nicht abgebrochen, sondern bis zu einer Dauer von mindestens 4 Wochen fortgeführt werden.

Kleienpilzflechte (Pityriasis versicolor) heilt im Allgemeinen in 1–3 Wochen, Zwergflechte in 2–4 Wochen ab.

Um einem Rückfall vorzubeugen sollte bei Fußpilz auch bei rascher Beschwerdebesserung ca. 4 Wochen über das Verschwinden aller Krankheitszeichen hinaus weiterbehandelt werden.

Nach jedem Waschen sollten die Füße (Zehenzwischenräume) gründlich abgetrocknet werden.

### Anwendungsfehler:

#### **Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig cutistad® Creme angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?**

Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie am folgenden Tag bitte nicht die doppelte Menge von cutistad® Creme an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Dosis wieder auf.

#### **Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?**

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker die weitere Vorgehensweise, da in beiden Fällen der Behandlungserfolg gefährdet ist.

### Nebenwirkungen:

#### **Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von cutistad® Creme auftreten?**

Durch cutistad® Creme kann es in seltenen Fällen zu Hautreaktionen (vorübergehende Rötung, Brennen oder Stechen), sowie in sehr seltenen Fällen zu allergischen Reaktionen bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol und 2-Phenoxyethanol kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt.

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

#### **Wie ist cutistad® Creme aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Stand der Information:

1. August 2003

Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient,

cutistad® Creme hat Ihnen Ihr Arzt verordnet, bzw. Ihr Apotheker empfohlen. cutistad® Creme enthält den Wirkstoff Clotrimazol, der seit vielen Jahren erfolgreich gegen Hautpilzkrankungen eingesetzt wird.

cutistad® Creme wird äußerlich aufgetragen, wirkt gegen alle Pilze, die beim Menschen zu Hautpilzkrankungen führen, und ist gut verträglich. Wichtig ist die regelmäßige und ausreichend lange Anwendung von cutistad® Creme, damit es zu keinem Rückfall kommt.

Neben cutistad® Creme sind noch cutistad® Lösung, cutistad® Puder sowie cutistad® Spray als umweltfreundliches Pumpspray erhältlich.



9210302  
0304

